

Práctico 1: Introducción

1. *a)* La energía de ionización del átomo de hidrógeno en su nivel fundamental es $E_{ion} = 13.60ev$. Calcular la frecuencia, longitud de onda y número de onda de la radiación electromagnética que ioniza al átomo.
b) Un laser He-Ne emite radiación con longitud de onda $\lambda = 633nm$. Cuántos fotones son emitidos por segundo por un laser con potencia igual a 1 mW ?.
2. *a)* El dipolo magnético μ de un loop de corriente se define como

$$\mu = I A , \quad (1)$$

donde I es la corriente, A es el área del loop, la dirección de A siendo perpendicular al plano del loop. Un loop de corriente se puede representar como una carga eléctrica e rotando a velocidad constante en una órbita circular cerrada. Use razonamiento clásico para mostrar que el dipolo magnético del loop está relacionado a L , el momento magnético orbital de la partícula por

$$\mu = \frac{e}{2m} L , \quad (2)$$

donde m es la masa de la partícula.

- b)* Si la magnitud de L es $\hbar(h/2\pi)$, calcular la magnitud de μ para (i) un electrón, y (ii) un protón.
3. La difracción de neutrones puede ser usada para determinar estructuras cristalinas.
 - a)* Estimar un valor apropiado para la velocidad de los neutrones.
 - b)* Calcular la energía cinética del neutrón en ev para esta velocidad.
 - c)* Es práctica común en este tipo de experimento seleccionar un haz de neutrones monoenergéticos de un gas de neutrones a temperatura T . Estimar un valor apropiado para la temperatura T .
4. Una partícula que se mueve en una dimensión tiene una función de estado

$$\psi(x) = \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{(1/4)}} \exp(-x^2/4\Delta^2) , \quad (3)$$

donde Δ es una constante. Mostrar lo siguiente.

- a)* La función de estado está correctamente normalizada.
- b)* La probabilidad de que la partícula tenga momento lineal en el rango p a $p+dp$ es $P(p)dp$, donde

$$P(p) = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{(1/2)} \frac{\Delta}{\hbar} \exp(-2p^2\Delta^2/\hbar^2) . \quad (4)$$

- c)* El producto de las incertezas en la posición y momento tiene un valor mínimo permitido por el principio de incertidumbre.

5. Estime los niveles de energía de :
 - a) Una partícula en una caja (en 1 dimensión).
 - b) El átomo de hidrógeno (estime también el volumen de este átomo).
6. Considere un paquete de ondas $\psi(x) = \int f(k) \exp(ikx) dk$ siendo $f(k)$ una función que tiene un máximo muy pronunciado en $k = k_o$, y es distinta de cero, solo en un intervalo Δk alrededor de k_o .
 - a) Muestre que el centro del paquete tiene una velocidad $\hbar k_o/m$.
 - b) Muestre que si Δx es la extensión del paquete debe ser $\Delta x \Delta k \sim 1$.
7. Un punto material de masa m se mueve sobre el eje x bajo la acción de una fuerza restauradora ($-K x$) proporcional a su distancia del origen (oscilador armónico). Aplicar la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld a este sistema, calcular la energía, el período y la amplitud de las trayectorias cuantizadas.
8. a) Aplique Bohr-Sommerfeld a un cristal infinito y demuestre que el impulso de dicho cristal está cuantizado.
 b) Aplicando lo anterior estudie la reflexión de un fotón en el cristal y deduzca la ley de Bragg.
 c) Considere ahora la reflexión de un electrón en el cristal y deduzca la relación de De Broglie en este caso particular.